АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ ГЛОБАЛЬНАЯ УГРОЗА

• Антибиотикорезистентность – процесс, при котором антибиотики не действуют на бактерии – сейчас происходит во всем мире.

• Точное влияние неизвестно. Не существует системы, позволяющей отследить устойчивость к антибиотикам на глобальном уровне.

• Если не принять срочные меры, многие современные лекарства могут попросту устареть, превращая даже обычные заболевания в смертельную угрозу.

НАРАСТАЮЩИЙ ВО ВСЕМ МИРЕ КРИЗИС

В США антибиотикорезистентность становится причиной 23.000 смертей ежегодно, а также причиной более 2 млн. случаев различных заболеваний.

В Евросоюзе антибиотикорезистентность является причиной 25.000 смертей ежегодно.

В **Индии** более 58.000 детей погибли за один год из-за инфекций, устойчивых к антибиотикам, которые передались от матерей.

Украина
НЕТ ДАННЫХ

ПРИЧИНЫ УСТОЙЧИВОСТИ К АНТИБИОТИКАМ

Нецелесообразное назначение антибиотиков

Несоблюдение режима приема антибиотиков пациентами

Нецелесообразное рименение антибиотиков в сельском хозяйстве

Недостаточный контроль инфекций в поликлиниках и больницах

Плохая гигиена и санация

Недостаток быстрых лабораторных анализов

Ненадлежащее и нерациональное использование **АНТИБИОТИКОВ** создает угрозу для всех нас

Неоправданный прием антибиотиков ускоряет развитие устойчивости к противомикробным препаратам, **одной из крупнейших угроз для здоровья людей во всем мире**

Вы можете помочь бороться с устойчивостью к антибиотикам

Заражение инфекциями, устойчивыми к антибиотикам, может приводить **к более продолжительной госпитализации, более высоким медицинским расходам и смерти большего числа пациентов**

Нерациональное использование антибиотиков может привести к развитию у бактерий устойчивости, а это означает, что сегодняшние лекарства окажутся неэффективными

Перед приемом антибиотиков всегда консультируйтесь с квалифицированным медицинским работником

Инфекцией, устойчивой к действию антибиотиков, может заразиться каждый, независимо от возраста и страны проживания

Устойчивость к антибиотикам приобретают сами бактерии, а не человек или животное

В результате развития у бактерий устойчивости **распространенные инфекции перестанут поддаваться лечению**

Сократить риск инфекции и уменьшить частоту использования антибиотиков

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ПИЩИ

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО (ЗАЩИЩЕННОГО) СЕКСА

При применении антибиотиков

ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВО ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

НЕ ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ АНТИБИОТИКАМИ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

РЕГУЛЯРНО И ТЩАТЕЛЬНО МЫТЬ РУКИ

ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ КАЛЕНДАРЯ ПРИВИВОК

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧИСТУЮ ВОДУ, ОТСТАИВАТЬ СВОЕ ПРАВО НА БЕЗОПАСНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ ИЗБЕГАТЬ КОНТАКТОВ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ

Устойчивость к антибиотикам развивается в результате изменения бактерий, которые становятся устойчивыми к антибиотикам, используемым для лечения вызываемых ими инфекций.

1. Принимайте только те антибиотики, которые **назначены** дипломированным специалистом здравоохранения
2. Всегда **доводите до конца** назначенный курс антибиотиков, даже если вы чувствуете себя лучше
3. **Никогда не используйте оставшиеся** антибиотики
4. **Никогда не делитесь** антибиотиками с другими людьми
5. **Предотвращайте инфекции** – регулярно мойте руки, избегайте контактов с больными людьми и своевременно вакцинируйтесь

Что нужно знать об антибиотиках

- Нерациональное использование антибиотиков может привести к развитию у бактерий устойчивости, а это означает, что сегодняшние лекарства окажутся неэффективными.
- Не все инфекции можно вылечить антибиотиками; антибиотиками не лечатся вирусные инфекции, такие как простуда или грипп.
- Принимайте только те антибиотики, которые были вам прописаны, не делитесь ими с членами семьи или друзьями.
- Антибиотики не всегда являются подходящим лекарством. Не просите назначить вам антибиотики, если ваш врач говорит, что вам они не нужны.
- Перед приемом антибиотиков всегда консультируйтесь с квалифицированным медицинским работником.

ПРАВИЛА приема антибиотиков

Показания к применению:

- длительная повышенная температура
- гнойные выделения
- изменение состава крови (увеличение лейкоцитов, повышенная СОЭ)
- после улучшения повторное ухудшение состояния

1. Рассказать врачу какой, когда, и в каких дозах принимали антибиотики ранее

2. Записать назначение врача

3. Не покупать аналогов антибиотиков без консультации с врачом

4. Строго соблюдать время и кратность приема (2 раза в день через 12 ч, 3 раза в день через 8 часов)

5. Не корректировать длительности приема курса антибиотиков без консультации с врачом

6. Не корректировать дозировку

7. Не запивать антибиотики молоком и кисломолочными продуктами, чаем, кофе и соками



8. Выяснить как пить антибиотики в зависимости от приема пищи